

## GESTION DE LA VESSIE DE MON ANIMAL PARALYSÉ

La vessie est un sac qui contient les urines et qui se vide grâce à l'action des muscles qui composent sa paroi. Lorsque votre animal est paralysé des pattes arrière, le muscle qui permet de vidanger la vessie ne fonctionne plus. De plus, le sphincter vésical (valve musculaire qui permet de contrôler l'ouverture/fermeture de la vessie) ne se relâche plus ; la vessie ne peut donc plus se vidanger toute seule.

### Pourquoi vider la vessie ?

Si la vessie ne se vidange pas d'elle-même, il est important de la vider pour éviter des complications : infections urinaires, infections aux reins, incontinence permanente, malgré une bonne évolution des déficits neurologiques liée à une distension trop importante des muscles de la vessie.

### Comment vider la vessie ?

Comme nous l'avons vu en consultation, la vidange s'effectue par une pression sur la vessie, que l'on trouve en arrière de l'abdomen.

Celle-ci peut s'effectuer à deux mains ou à une main, selon la taille de votre animal.

Il est plus facile de vidanger la vessie sur un animal mis en position debout, avec l'aide d'une seconde personne ; toutefois la vidange peut s'effectuer, animal allongé sur le côté.

Si vous ne sentez pas la vessie, une pression modérée et constante sur la partie arrière du ventre, en avant du bassin peut permettre une vidange.

### Combien de fois vider la vessie ?

Au minimum 2 à 3 fois par jour.

### Quand arrêter de vider la vessie ?

Votre animal retrouvera la fonction de sa vessie après une opération de hernie discale, lorsqu'il retrouvera des mouvements volontaires des pattes arrière.

Si votre animal ne montre pas de mouvement des pattes arrière, il est probable qu'il urine par trop plein : petites quantités d'urine, ressemblant à de l'incontinence ; il faut alors continuer de vider la vessie manuellement car celle-ci est trop pleine.

Dès que votre animal présente un jet d'urine en continu, spontanément sans qu'aucune pression ne soit appliquée sur son ventre ou si vous retrouvez une grande quantité d'urine sur son lieu de couchage, vous pouvez arrêter de vider la vessie manuellement.

### Quid des médicaments ?

Votre vétérinaire a pu vous prescrire des médicaments pour relâcher la vessie, tel que Xatral ou dantrolène/-dantrium. Ceux-ci permettent de relâcher le sphincter de la vessie et facilitent la vidange vésicale.

Toutefois, ils ne remplacent pas la vidange manuelle et ne sont qu'une aide pour faciliter celle-ci. Les médicaments peuvent être arrêtés si votre animal urine de nouveau normalement sans aide.

### Quand contacter mon vétérinaire ?

Si votre animal n'urine pas ou que vous ne parvenez pas à vider sa vessie pendant plus de 24 heures, il est important de contacter un vétérinaire afin de vidanger sa vessie.

De même, contactez un vétérinaire si les urines vous paraissent odorantes, rouges ou marron foncées car ce peut être un signe d'infection urinaire débutante.